

定期予防接種一覧				
ワクチン	接種	対象年齢 (無料で受けられる年齢)	標準的な接種年齢 (接種をお勧めする年齢)	回数
小児用肺炎球菌	初回	生後 2～60 か月未満	生後 2～7 か月未満	3 回 ※1
	追加		初回接種終了後、 生後 12～15 か月未満	1 回 ※1
ロタウイルス (ロタリックス)	1 回目	生後 6 週以上 24 週未満		2 回
	2 回目			
ロタウイルス (ロタテック)	1 回目	生後 6 週以上 32 週未満		3 回
	2 回目			
	3 回目			
B型肝炎	1 回目	1 歳未満	生後 2～9 か月未満	3 回
	2 回目			
	3 回目			
五種混合 (百日咳・ジフテリア・ 破傷風・不活化ポリオ・ ヒブ)	初回	生後 2～90 か月未満	生後 2～7 か月未満	3 回
	追加		1 期初回接種終了から 6～18 か月の間隔をおいて	1 回
BCG※2		生後 3～12 か月未満	生後 5～8 か月未満	1 回
麻しん風しん混合 (MR)	1 期	生後 12～24 か月未満	対象年齢内で、できるだけ早期 に	1 回
	2 期	小学校就学前 1 年間	年長児	1 回
水痘	1 回目	生後 12～36 か月未満	生後 12～15 か月未満	1 回
	2 回目		初回接種終了後、 6～12 か月の間隔をおいて	1 回
日本脳炎	1 期初回	生後 6～90 か月未満	3 歳	2 回
	1 期追加		4 歳	1 回
	2 期	9～13 歳未満	小学校 4 年※3	1 回
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	2 期	11～13 歳未満	小学校 6 年※3	1 回
子宮頸がん予防 (ヒトパピローマウイル ス)	1 回目	小学 6 年～高校 1 年 (16 歳相当) の女子	中学 1 年の女子※3	3 回
	2 回目			
	3 回目			

※1) 回数については生後 2～7 か月未満に接種を開始した場合のものを記載しています。

※2) BCG ワクチンは、出生後早い時期に受けたときの重い副反応を避けるため、生後 3 か月からの接種をお知らせしています。

※3) 標準的な接種年齢に合わせて予診票を送付します。早くの接種をご希望の方は、母子手帳をもって福祉保健課までお越しください。